

FICHA TÉCNICA

Seraquin®

Alimento complementario para perros y gatos

¿Qué es Seraquin?

Seraquin es un alimento complementario para ayudar a mantener la funcionalidad normal del cartílago articular en perros y gatos.

Modo de empleo

Periodo inicial de 4-6 semanas (o según recomiende el veterinario):

- Menos de 10 kg: 1 comprimido al día
- De 10 – 20 kg: 2 comprimidos al día
- De 20 – 40 kg: 3 comprimidos al día
- Más de 40 kg: 4 comprimidos al día

Después de un período inicial de 4-6 semanas de administración, la dosis diaria puede reducirse gradualmente a razón de medio comprimido a la semana. Esta reducción puede repetirse semanalmente hasta conseguir un nivel de mantenimiento de la mitad de la dosis inicial.

Seraquin puede administrarse directamente o se puede desmenuzar y mezclar con la comida habitual.

Composición:

Levadura inactivada (*Saccharomyces cerevisiae*), glucosamina HCl, condroitín sulfato sódico, sacarosa, proteína de pollo hidrolizada, glucosa, proteína de maíz y extracto turmérico.

Aditivos:

La información puede solicitarse al distribuidor.

Cada comprimido masticable contiene: glucosamina HCl 500 mg, condroitín sulfato sódico 380 mg y extracto turmérico 50 mg.

La glucosamina, el condroitín y el extracto turmérico (curcumina) son componentes importantes para el mantenimiento de una articulación sana y de su normal funcionalidad.

Contenido analítico: proteína 28,8 %, materia inorgánica 7,7 %, contenido de grasa 2,7 % y fibras brutas 0,1 %.

Almacenar en un lugar seco, a temperatura inferior a 30 °C.

60 x 2 g comprimidos masticables

Reg. nº: 28118 - CAT

Titular:

Boehringer Ingelheim España, S.A.
Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
España
Tel.: +34 -93 404 51 00
ESP08601366

Fabricado para:

Boehringer Ingelheim Denmark A/S
Reg. nº: 208-R854833

Preguntas más frecuentes:**P: ¿Se tomará mi mascota los comprimidos Seraquin?**

R: Seraquin es muy apetecible para la mayoría de perros/gatos, pudiéndose administrar directamente o desmenuzar y mezclar con la comida habitual.

P: ¿Puede administrarse Seraquin simultáneamente con otros tratamientos para la artritis?

R: Sí, no se han observado interacciones entre Seraquin y los tratamientos farmacológicos habituales para la artritis. Esto es debido a que Seraquin está compuesto de sustancias naturales, tales como el condroitín, la glucosamina y el extracto turmérico.

P: ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir hasta que los efectos de Seraquin puedan ser visibles?

R: Depende del estado general, edad y peso de su perro/gato. Sin embargo, como norma general, se observa un cambio normalmente durante las primeras 4-6 semanas. Después de un período inicial de 4-6 semanas de administración, la dosis diaria puede reducirse gradualmente a razón de medio comprimido a la semana. Esta reducción puede repetirse semanalmente hasta conseguir un nivel de mantenimiento de la mitad de la dosis inicial. Si durante este período cambia el estado del animal, consulte al veterinario.

P: ¿Durante cuánto tiempo será necesario administrar Seraquin a mi mascota?

R: Dependerá mucho de las condiciones del animal y de la recomendación de su veterinario. Muchos animales pueden requerir una administración prolongada de Seraquin.

P: ¿Tiene Seraquin algún efecto adverso?

R: No se han observado efectos adversos.